

意識 (JCS)

不穩、失禁、自発性喪失

0 | II III
清明 1 2 3 10 20 30 100 200 300


高次脳機能障害

(失認・失行・注意障害・記憶障害・前頭葉症状・その他)

運動障害

Br.stage 上肢 手指 下肢


感覚障害・反射



表在：軽・中・重 深部：軽・中・重
異常感覚・錯感覚・感覚過敏・()

関節可動域

頸部・体幹(円背・側弯・その他)



寝返り

完全自立、修正自立
介助(部分・最小・中等度・最大・全介助)

起居

完全自立、修正自立
介助(部分・最小・中等度・最大・全介助)

起立

完全自立、修正自立
介助(部分・最小・中等度・最大・全介助)

立位

完全自立、修正自立
介助(部分・最小・中等度・最大・全介助)

移乗

完全自立、修正自立
介助(部分・最小・中等度・最大・全介助)

移動

完全自立、修正自立
介助(部分・最小・中等度・最大・全介助)

食事

完全自立、修正自立
介助(部分・最小・中等度・最大・全介助)

整容

完全自立、修正自立
介助(部分・最小・中等度・最大・全介助)

更衣

完全自立、修正自立
介助(部分・最小・中等度・最大・全介助)

排泄

完全自立、修正自立
介助(部分・最小・中等度・最大・全介助)

入浴


完全自立、修正自立
介助(部分・最小・中等度・最大・全介助)

階段


完全自立、修正自立
介助(部分・最小・中等度・最大・全介助)

ADL

股関節 外旋 内旋



足関節 背屈・底屈



筋力

		左	右
肩	屈曲	5・4・3・2・1・0	5・4・3・2・1・0
	外転	5・4・3・2・1・0	5・4・3・2・1・0
	外旋	5・4・3・2・1・0	5・4・3・2・1・0
	内旋	5・4・3・2・1・0	5・4・3・2・1・0
肘	屈曲	5・4・3・2・1・0	5・4・3・2・1・0
	回内	5・4・3・2・1・0	5・4・3・2・1・0
前腕	回外	5・4・3・2・1・0	5・4・3・2・1・0
	掌屈	5・4・3・2・1・0	5・4・3・2・1・0
手	背屈	5・4・3・2・1・0	5・4・3・2・1・0
	屈曲	5・4・3・2・1・0	5・4・3・2・1・0
股	外転	5・4・3・2・1・0	5・4・3・2・1・0
	外旋	5・4・3・2・1・0	5・4・3・2・1・0
	内旋	5・4・3・2・1・0	5・4・3・2・1・0
	屈曲	5・4・3・2・1・0	5・4・3・2・1・0
膝	伸展	5・4・3・2・1・0	5・4・3・2・1・0
足	背屈	5・4・3・2・1・0	5・4・3・2・1・0